

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРА



№ 10 от 22 сентября 2023 года

Адрес: 344029 г. Ростов-на-Дону, ул. 1-й Конной Армии, 15а, офис 11. E-mail: monitoringro@yandex.ru

Исх № 2–384 от 22.09.2023 г.

Уборка и хранение урожая овощных культур

- **Картофель:** уборка ранних сортов картофеля начинается с августа. При использовании спецтехники (картофелекопалки) поле нужно очистить от ботвы и оставить на 10-14 дней для формирования плотной кожуры, уменьшающей повреждения при уборке и транспортировке. Уборку проводят в сухую солнечную погоду, чтобы корнеплоды могли обсохнуть и не загнивали во время хранения. Хранят картофель в деревянной, картонной таре или сетках, что обеспечивает достаточную аэрацию, тем самым снижая риск загнивания плодов.
- **Лук (репчатый, порей, севок, шалот):** уборка проводится с середины июля до конца августа для всех кроме порея (для него оптимально начало уборки в начале октября). После уборки лук необходимо просушить в вентилируемом сухом помещении или под навесом, чтобы избавиться от излишков влаги. После сушки удаляют ботву и обрабатывают ингибитором роста, дабы избежать прорастания. Хранят лук в деревянной, картонной таре или сетках, что обеспечивает достаточную аэрацию, тем самым снижая риск загнивания плодов.
- **Другие корнеплоды (морковь, редис осеннего сева, свёкла, репа, дайкон):** уборку проводят с конца августа по середину октября до того, как начнутся заморозки. Ботва удаляется со всех корнеплодов, кроме редиса, для улучшения их сохранности.
- **Капуста:** уборку ранних сортов начинают с июля. Позднеспелые сорта довольно морозоустойчивы и выдерживают температуру до -7°C , по этому их сбор проводят с сентября по октябрь. Погоду выбирают прохладную и солнечную.
- **Кабачки:** уборка ранних сортов начинается с июня, а поздних с сентября по октябрь. Заканчивается, как только начнёт подсыхать ботва.
- **Тыква:** уборка проводится с сентября по октябрь. Заканчивается, как только начнёт подсыхать ботва.

Хранить плоды овощных культур следует в вентилируемом помещении с влажностью воздуха не более 80% при температуре от 0 до $+2^{\circ}\text{C}$. Перед засыпкой на хранение следует обработать помещение и тару раствором медного купороса. Во избежание повреждения плодов мышевидными грызунами помещения окуривают серными шашками и устанавливают отравленные приманки (Бактороденцид ПР). Плоды овощных культур хранятся в помещениях при температуре от 0 до $+2^{\circ}\text{C}$. Несоблюдение температурного режима чревато развитием болезней и вредителей (таких как картофельная моль).