МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБУ «Россельхозцентр»
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области

СИГНАЛИЗАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРА

№ 7 от 17 мая 2023 года

Адрес: 344029, Ростов-на-Дону, ул. 1-й Конной Армии, 15а, офис 11

E-mail: monitoringro@yandex.ru

Исх. № 2-195 от 17.05.2023 г.

Итальянский прус

Отдел защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области сообщает, что при проведении фитосанитарного обследования в Ремонтненском районе Ростовской области выявлено начало отрождения личинок итальянского пруса — стадного вида саранчовых, особо опасного многоядного вредителя, способного повреждать практически любые сельскохозяйственные культуры.

На данный момент численность личинок составляет 0,1 экз./м².

Руководителям хозяйств необходимо организовать мониторинг численности в границах Ремонтненского, Заветинского, Зимовниковского, Дубовского, Орловского, Песчанокопского, Пролетарского и Сальского районов. При обследовании следует уделить внимание пастбищным, целинным и бросовым участкам, на которых могут быть отмечены и другие виды саранчовых вредителей. При выявлении численности вредителей, превышающей экономический порог вредоносности (ЭПВ), необходимо проводить обработки инсектицидами для снижения численности. Для борьбы с саранчовыми вредителями эффективны препараты на основе **имидаклоприда**, **дифлубензурона**, **гамма-цигалотрина**, **лямбда-цигалотрина**, **фипронила**, **альфа-циперметрина**. Обработки необходимо проводить ранним утром или вечером, когда температура воздуха снижена и саранчовые вредители пребывают в состоянии пониженной активности. Достаточной эффективностью и экономичностью обладают барьерные обработки, осуществляемые на площадях, располагающихся в виде полос поперёк путей движения кулиг личинок.

ЭПВ личинок саранчовых вредителей на сельхозугодиях

Вид	ЭПВ, экз./м^2
Азиатская перелётная саранча	1–2
Итальянский прус	2–5
Мароккская саранча	2–5
Кобылки (крестовая и др.)	10–15

В качестве экологически безопасного биологического метода борьбы применяется обработка мест, заселённых личинками 1–2 возрастов, инсектицидом на основе живой культуры энтомопатогенного гриба **Метаризин Ж**.

По вопросам проведения обследований, обработок, консультаций обращайтесь в филиал Россельхозцентра по Ростовской области
Телефон: 8 (863) 251– 57–71

Важно!

Применение пестицидов и агрохимикатов в сельскохозяйственном производстве проводится только после предварительного обследования сельскохозяйственных угодий. Следует применять только препараты, включённые в «Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешённых к применению на территории Российской Федерации», в соответствии с установленными регламентами!